

Bækken og kønsorganer


Michel Bach Hellfritzsch

1


Det mandlige bækken og genitalia Billedanatomi

Michel Bach
Hellfritzsch

2




3




4





Prostata regionen:

- 1) Prostata
- 2) Urethra, pars prostatica
- 3) "Colliculus seminalis"
- 4) M. sphincter urethrae externus
- 5) "Pars bulbosa" af urethra
- 6) M. levator ani (inferomedialt)
- 7) Vesicula seminalis




Bhavsar et al.: "Anatomic Imaging of the Prostate" BioMed Research International 2014


7




Exploratio rectalis




8




9




10




11



12



13




14




15



16




17



18

Testes




Eur. Radiol. 9, 16-28 (1999),
R.A. Kubik-Huch et al.




19

Normal anatomy?



20

Normal anatomi?




21


Normal anatomi?
Højre testis ligger
ikke i scrotum




22




23



24




25



26


Yngre mand behandlet for c. testis.



Lymfedrænage langs a. testicularis til lymphonodi lumbales.


27

Yngre mand behandlet for c. testis: Kontrolskanning.




28

Yngre mand behandlet for c. testis: Kontrolskanning.



29

Yngre mand behandlet for c. testis: Skanning efter kemoterapi.




30

Det kvindelige bækken og genitalia Billedanatomi

Michel Bach
Hellfritzsch


31




32




33




34




35




36




37



38




39




40




41




42



43




44



45



46




47

Transvaginal UL: Uterus


- A) Proliferative fase (trilaminær endometrium)
- B) Sekretoriske fase (homogen ekkorig endometrium)
- C) Lige postmenstruelt

Roohi: "Imaging and the Infertility Evaluation", CLINICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, vol. 60, No. 1, 93-107.




Roach et al.: "The Normal Female Pelvis", CLINICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, vol. 60, No. 1, 3-10.


48




49




50



51



52



53

Hysterosalpingografi (HSG)

Er i dag erstattet af ultralydundersøgelse med brug af væske eller laparoskopi.


Billederne er medtaget, da de illustrerer de anatomiske forhold

54


Hysterosalpingografi (HSG)

- ◊ Ved HSG indsprøjtes et røntgenkontraststof via et kateter i uterinkaviteten, og kontraststoffet følges til peritoneum.
- ◊ Er i dag erstattet af ultralydundersøgelse med brug af væske eller laparoskopi.
- ◊ Billederne er medtaget, da de giver et godt overblik over de anatomiske forhold.

55



56



57




58


Sactosalpinges: Aflukning af salpinges




59




60




61




62



63



64





65





66

Kvinde gravid i 6. uge (Gestationsuge 5 + 2-4 dage)



Præsomit embryo og trofoblast i slutningen af tredje uge



67

Foetobiometri

68



69




70




71




72




73



74



75



76